

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Fusidic/Target® 20mg/g κρέμα

Φουσιδικό οξύ

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Fusidic/Target® και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Fusidic/Target®
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Fusidic/Target®
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Fusidic/Target®
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Fusidic/Target® και ποια είναι η χρήση του

Το Fusidic/Target® είναι αντιβιοτικό το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων του δέρματος και δερματικών αποστημάτων.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το Fusidic/Target®

Μην χρησιμοποιήσετε το Fusidic/Target®:

- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στο φουσιδικό οξύ ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- Όπως και με όλα τα αντιβιοτικά, παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη χρήση του φουσιδικού οξέος ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό.
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του Fusidic/Target® στην περιοχή των ματιών.

Άλλα φάρμακα και Fusidic/Target®:

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

- Δεν αναμένονται επιδράσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεδομένου ότι η συστηματική έκθεση στις τοπικές μορφές φουσιδικού οξέος είναι αμελητέα. Η κρέμα Fusidic/Target® μπορεί να

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

- Δεν αναμένονται επιδράσεις από το θηλασμό στο νεογνό/βρέφος, δεδομένου ότι η συστηματική έκθεση της θηλάζουσας γυναίκας στις τοπικές μορφές φουσιδικού οξέος είναι αμελητέα. Η

κρέμα Fusidic/Target® μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το θηλασμό αλλά συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή τους στην περιοχή του στήθους.

- Δεν αναμένονται επιδράσεις σε γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης, δεδομένου ότι η συστηματική έκθεση στο τοπικώς εφαρμοζόμενο φουσιδικό οξύ είναι αμελητέα.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Η κρέμα Fusidic/Target® δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Η κρέμα Fusidic/Target® περιέχει βουτυλοϋδροξυανισόλη, κητυλική αλκοόλη και σορβικό κάλιο. Τα έκδοχα αυτά μπορεί να προκαλέσουν τοπικές δερματικές αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα εξ' επαφής). Επιπλέον, η βουτυλοϋδροξυανισόλη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των οφθαλμών και των βλεννογόνων. Συνεπώς, η κρέμα Fusidic/Target® πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή όταν εφαρμόζεται στα μάτια.

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Fusidic/Target®

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνιστώμενη δόση είναι:

Η κρέμα Fusidic/Target® εφαρμόζεται στην περιοχή που πάσχει 2-3 φορές την ημέρα για περίοδο όχι μεγαλύτερη των 7 ημερών.

Αν χρησιμοποιηθεί με προστατευτικό επίδεσμο προτείνεται πιο αραιή εφαρμογή.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Fusidic/Target® από την κανονική

Είναι απίθανο να συμβεί υπερδοσολογία.

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Fusidic/Target®

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Fusidic/Target®

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν λιγότερους από 1 στους 100 ανθρώπους)

- δερματίτιδα
- εξάνθημα
- κνησμός
- ερύθημα
- πόνος και ερεθισμός στο σημείο της εφαρμογής

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν λιγότερους από 1 στους 1000 ανθρώπους)

- υπερευαισθησία
- επιπεφυκίτιδα
- αγγειοοίδημα
- κνίδωση
- φλύκταινα
-

Συμπληρωματικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά

Η συχνότητα, ο τύπος και η σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών αναμένονται να είναι ίδιες στα παιδιά και στους ενήλικες.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του

Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21032040380/337, Φαξ: +30 21 06549585, Ιστότοπος: <https://www.eof.gr>.

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το Fusidic/Target®

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην στο κουτί και στο σωληνάριο μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Fusidic/Target®

Η δραστική ουσία είναι το φουσιδικό οξύ. 1 γραμμάριο κρέμας Fusidic/Target περιέχει 20 mg φουσιδικό οξύ.

Τα άλλα συστατικά είναι: Βουτυλοϋδροξυανισόλη, κητυλική αλκοόλη, γλυκερόλη, σορβικό κάλιο, υγρή ελαφρά παραφίνη, πολυσορβικό 60, λευκή μαλακή παραφίνη, ύδωρ κεκαθαρμένο.

Εμφάνιση του Fusidic/Target® και περιεχόμενα της συσκευασίας

Κρέμα σε σωληνάριο αλουμινίου των 15 g, τοποθετημένο σε κουτί χάρτινο. Το στόμιο είναι κλειστό με μεταλλικό κάλυμμα.

Κρέμα σε σωληνάριο αλουμινίου των 30 g, τοποθετημένο σε κουτί χάρτινο. Το στόμιο είναι κλειστό με μεταλλικό κάλυμμα.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

TARGET PHARMA MON/ΠΗ ΕΠΕ

Μενάνδρου 54, 104 31 Αθήνα

Τηλ.: 210 5224830

Φαξ: 210 5224838

E-mail: info@targetpharma.gr

<http://www.targetpharma.gr>

Παρασκευαστής

ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ

Λεωφ. Πάρνηθος 189,

Αχαρνές Αττικής, Ελλάδα

Τηλ: +30 2110135025-7

Email: info@kleva.gr

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 05-08-2021.